

loratadina



SANDOZ

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

loratadina 10 mg. Embalagem contendo 6, 10, 12 ou 20 comprimidos.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 10 mg contém:

loratadina..... 10 mg
excipientes q.s.p. 1 comprimido
(amido, lactose, celulose microcristalina e estearato de magnésio)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Leia atentamente este texto antes de começar a tomar o medicamento, ele informa sobre as propriedades deste medicamento. Se persistirem dúvidas ou estiver inseguro fale com seu médico.

Antes de utilizar o medicamento, confira o nome do rótulo e não administre caso haja sinais de violação e/ou danos na embalagem.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A loratadina pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como anti-histamínicos. Os anti-histamínicos ajudam a reduzir os sintomas da alergia, prevenindo os efeitos da histamina, que é uma substância produzida pelo próprio corpo.

Os sinais e sintomas oculares e nasais da rinite alérgica são rapidamente aliviados após a administração oral do produto.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

A loratadina é indicada para o alívio dos sintomas associados à rinite alérgica (por exemplo: febre do feno), como: coceira nasal, nariz escorrendo (coriza), espirros, ardor e coceira nos olhos. A loratadina também é indicada para o alívio dos sinais e sintomas de urticária e outras alergias da pele.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contra-indicações

Este produto não deve ser utilizado se você já teve qualquer tipo de reação alérgica ou reação incomum a qualquer um dos componentes da fórmula do produto.

Advertências

Se você está grávida ou amamentado, se você é alérgico a sulfatos ou se você tiver algum problema no fígado, procure seu médico ou farmacêutico.

Uso durante gravidez e lactação (amamentação)

Não está estabelecido se o uso de loratadina pode acarretar riscos durante a gravidez ou lactação. Portanto, o medicamento só deverá ser utilizado se os benefícios potenciais para a mãe justificarem o risco potencial para o feto.

Considerando que a loratadina é excretada no leite materno e devido ao aumento do risco do uso de anti-histamínicos por crianças, particularmente por recém-nascidos e prematuros, deve-se optar ou pela descontinuação da lactação ou pela interrupção do uso do produto.

Pacientes Idosos

Nos pacientes idosos não há necessidade de alteração na dose, pois não ocorrem alterações na metabolização decorrente da idade. Devem-se seguir as mesmas orientações dadas aos adultos.

Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.

Precauções

Caso você tenha alguma doença no fígado ou insuficiência renal, a dose inicial deve ser diminuída para

01 comprimido em dias alternados. Nestes casos, procure seu médico.

Interações medicamentosas

A loratadina não tem demonstrado efeito aditivo com bebidas alcoólicas.

Alterações em exames laboratoriais

Comunique seu médico ou farmacêutico se você for fazer algum teste de pele para detectar alergia. O tratamento com loratadina deverá ser suspenso dois dias antes da execução deste, pois poderá afetar os resultados.

Esse medicamento não deve ser utilizado por crianças com peso inferior a 30 kg.

Informe ao médico ou cirurgião dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

A loratadina não deve ser utilizada durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe ao seu médico se ocorrer gravidez, ou antes, de iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

Informe ao médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aspecto Físico

Verifique se o medicamento que você usa possui as seguintes características:

Os comprimidos de loratadina são brancos, arredondados e com ambas as faces lisas.

Dosagem

Adultos: Um comprimido, uma vez ao dia.

Crianças com peso corporal acima de 30 kg: Um comprimido, uma vez ao dia.

A duração do tratamento deverá seguir a orientação médica.

Se você esquecer de tomar uma dose na hora certa, tome-a assim que possível e, depois, reajuste os horários de acordo com a última dose tomada, continuando o tratamento de acordo com os novos horários programados. Não tome duas doses de uma só vez.

Seu médico ou farmacêutico irá informar quando você deve parar de tomar este medicamento.

Como usar

A loratadina é indicada para uso oral e deve ser utilizada de acordo com as instruções contidas no item Dosagem.

Este medicamento pode ser administrado juntamente com alimentos, pois a alimentação não interfere na sua ação.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento. A data de fabricação e o prazo de validade estão impressos na embalagem externa do produto.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Junto com os efeitos necessários para o tratamento, os medicamentos podem causar efeitos não desejados. Apesar de nem todos os efeitos colaterais ocorrerem, você deve procurar atendimento médico caso algum deles ocorra. A loratadina geralmente não causa secura na boca ou sonolência.

Os efeitos mais comuns são: dor de cabeça, cansaço, perturbação estomacal, nervosismo e erupção da pele. Em casos raros, foram relatados: perda de cabelo, reações alérgicas severas e problemas de fígado.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Este medicamento deve ser usado somente na dose recomendada.

Se você utilizar uma grande quantidade deste medicamento, procure imediatamente socorro médico levando a bula do produto.

O que fazer antes de procurar socorro médico?

Deve-se evitar a provocação de vômitos a ingestão de alimentos ou bebidas. O mais indicado é procurar um serviço médico, portando a embalagem do produto e, de preferência, sabendo-se a quantidade exata de medicamento ingerido pelo paciente. Pode-se, alternativamente, solicitar o auxílio ao Centro de controle de intoxicação da região, o qual deve fornecer as orientações para a superdose em questão.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em local fresco (15 - 30°C).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS

“Para sua segurança, não descarte a bula e o cartucho até o uso total deste medicamento”.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA**

Lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.

Reg. M.S.: 1.0047.0448

Farm. Resp.: Luciana A. Perez Bonilha
CRF-PR nº 16.006

Fabricado por:
Novartis (Bangladesh) Ltd.
Bangladesh

Importado por:
Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda.
Rod. Celso Garcia Cid (PR-445), Km 87, Cambé-PR
CNPJ: 61.286.647/0001-16 - Indústria Brasileira

 **SANDOZ®**
Uma decisão saudável

Código: 46006555 Laetus: 797 Dimensões: 160 x 300mm

 **SAC**
0800 4009192