

simeticona



SANDOZ

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

simeticona 40 mg. Embalagem contendo 20 comprimidos.

simeticona gotas. Frasco contendo 15 mL.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 40 mg contém:

simeticona..... 40 mg
excipientes q.s.p. 1 comprimido
(lactose, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, fosfato de cálcio dibásico, dióxido de silício e estearato de magnésio)

Cada mL de simeticona gotas contém:

simeticona..... 75 mg
veículo q.s.p. 1 mL
(propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, ciclamato sódico, goma xantana, aroma de cereja, corante vermelho pounceaux, celulose microcristalina + carmelose sódica, água)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Leia atentamente este texto antes de começar a tomar o medicamento, ele informa sobre as propriedades deste medicamento. Se persistirem dúvidas ou estiver inseguro fale com seu médico.

Antes de utilizar o medicamento, confira o nome do rótulo e não administre caso haja sinais de violação e/ou danos na embalagem.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A **simeticona** atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, rompendo as bolhas que retêm os gases e que provocam flatulências e dores. Assim, os gases são eliminados mais facilmente, diminuindo o desconforto causado por eles.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

A **simeticona** é indicada para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, ou seja, o incômodo, estufamento, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases alivia estes sintomas.

A **simeticona** também pode ser usado como medicação

auxiliar em exames médicos como na endoscopia digestiva, e no preparo dos pacientes para radiografia do abdômen.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contra-Indicações

Você não deve utilizar **simeticona** se tiver alergia ou sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Advertências

Como a **simeticona** é bem tolerada, não há advertências ou recomendações especiais sobre o seu uso.

Precauções

Como a **simeticona** é bem tolerada, não há precauções ou recomendações especiais sobre o seu uso.

Interações Medicamentosas

Não são conhecidas interações de **simeticona** com outros medicamentos ou alimentos.

Não há recomendações especiais para pacientes idosos e crianças.

“Informe ao médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento”.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA**

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

simeticona comprimidos:

Características organolépticas: comprimidos brancos de forma circular.

Você deve engolir o comprimido com um pouco de água.

Posologia: Tomar 1 comprimido 3 vezes ao dia, junto das refeições.

simeticona gotas:

Características organolépticas: emulsão de coloração rosa.

Você pode administrar as gotas diretamente na boca, ou diluir em um pouco de água e outro alimento.

VOCÊ DEVE AGITAR O FRASCO DE SIMETICONA GOTAS ANTES DE USAR

Posologia:

Crianças - lactentes : 4 a 6 gotas, 3 vezes ao dia.

Até 12 anos: 6 a 12 gotas, 3 vezes ao dia.

Acima de 12 anos e Adultos: 16 gotas, 3 vezes ao dia.

“Não use o medicamento com o prazo de validade

vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento. A data de fabricação e o prazo de validade estão impressos na embalagem externa do produto”.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

A **simeticona** não entra no organismo, atuando somente dentro do aparelho digestivo, e é totalmente eliminada nas fezes, sem alterações. Dessa maneira, não costuma provocar reações indesejáveis no organismo.

Você deve informar ao seu médico o aparecimento de reações indesejáveis, ou seja, efeitos diferentes do esperado.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Não se espera que ocorram sintomas causados pelo uso exagerado de **simeticona**, pois este medicamento não entra no organismo.

Caso você, acidentalmente, use **simeticona** em uma quantidade maior do que a recomendada, você deve procurar um médico imediatamente.

“Em caso de superdose procure um centro de controle de intoxicação ou socorro médico”.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O medicamento deve ser mantido em sua embalagem original. Conservar em temperatura ambiente (15-30°C). Proteger da umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

“Para sua segurança, não descarte a bula e o cartucho até o uso total deste medicamento”.

Lote, data de fabricação e validade: vide cartucho.

Reg. M.S. **simeticona** comprimidos: 1.0047.0465

Reg. M.S. **simeticona** gotas: 1.0047.0460

Farm. Resp.: Luciana A. Perez Bonilha

CRF-PR nº 16.006

Fabricado por:

Laboratório Teuto Brasileiro S/A
VP7 - D - Módulo 11 - Quadra 13 - DAlA
Anápolis - GO
CNPJ: 17.159.229/0001-76
Indústria Brasileira

Para:

Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda.
Rod. Celso Garcia Cid (PR-445), Km 87 - Cambé-PR
CNPJ: 61.286.647/0001-16 - Indústria Brasileira



Uma decisão saudável

Código: 402595 Dimensões: 160 x 180mm

