

SecniHEXAL™

secnidazol



FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

SecniHEXAL™ 1000 mg. Embalagem contendo 2 ou 4 comprimidos.

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 1000 mg contém:

secnidazol..... 1000 mg
excipientes q.s.p. 1 comprimido
(celulose microcristalina, amido de milho, amidoglicolato de sódio, dióxido de silício coloidal, povidona e estearato de magnésio)

USO ADULTO

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento

SecniHEXAL™ é um medicamento parasiticida, indicado para o tratamento de giardíase, amebíase intestinal sob todas as formas e tricomoníase.

Cuidados de armazenamento

O medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em local fresco (15-30°C), seco e ao abrigo da luz.

Prazo de validade

Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Não é recomendável o uso de qualquer medicamento com o prazo de validade vencido.

Gravidez e lactação

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. **SecniHEXAL™** deve ser administrado em uma das refeições, preferencialmente à noite, após o jantar. Os comprimidos devem ser tomados em dose única conforme prescrição médica. Na impossibilidade de ingestão em dose única, ingerir os comprimidos em intervalo de alguns minutos, mas nunca em intervalo maior que 30 minutos, a fim de não comprometer a eficácia do tratamento.

Interrupção do tratamento

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas

Em geral, **SecniHEXAL™** é bem tolerado, podendo ocorrer reações desagradáveis como: náuseas, vômitos, dor de estômago, gosto metálico na boca, estomatites e reações alérgicas. Caso ocorra qualquer reação desagradável, comunique ao seu médico, que lhe dará a orientação adequada.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Ingestão concomitante com outras substâncias

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento. Como acontece com outros imidazólicos, deve-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento com **SecniHEXAL™** e por até 4 dias após o seu término.

Contra-indicações e precauções

SecniHEXAL™ não deve ser utilizado por pacientes alérgicos a este medicamento, por pacientes com suspeita de gravidez, ou no primeiro trimestre desta e durante a amamentação.

Não deve ser utilizado durante a gravidez e a lactação.

As parasitoses intestinais são amplamente difundidas em crianças e adultos de todas as classes sociais. Para evitá-las deve-se:

- lavar as mãos antes de comer e após defecar;
- comer de preferência alimentos cozidos;
- beber água filtrada ou esfriada após a fervura;
- manter as unhas cortadas;
- conservar os alimentos longe de insetos;
- comer de preferência verduras frescas e lavadas com água corrente;
- evitar andar descalço e não pisar nem nadar em águas paradas.

Observando estas recomendações, pode-se evitar que as parasitoses intestinais atinjam a sua família.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição

O secnidazol, princípio ativo de **SecniHEXAL™**, é um derivado sintético da série dos nitroimidazóis, dotado de poderosa atividade parasiticida. Alguns estudos recentes têm demonstrado que o secnidazol pode ser uma alternativa terapêutica para as vaginites inespecíficas (geralmente provocadas pela *Gardnerella vaginalis*).

Farmacocinética

Após administração em dose única de 2000 mg de secnidazol, na forma de 2 comprimidos de 1000 mg, as taxas séricas máximas são obtidas na 3ª hora. A meia-vida plasmática é em torno de 25 horas. A eliminação, essencialmente urinária, é lenta (cerca de 50% da dose administrada é excretada em 120 horas). O secnidazol atravessa a barreira placentária e é excretado no leite materno.

INDICAÇÕES

Giardíase; amebíase intestinal sob todas as formas; tricomoníase.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade aos derivados imidazólicos ou a qualquer componente da fórmula; suspeita de gravidez e nos três primeiros meses desta; aleitamento.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Como acontece com outros imidazólicos, deve-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento com SecniHEXAL™ e por até 4 dias após o seu término.

Recomenda-se também evitar a administração de SecniHEXAL™ aos pacientes com antecedentes de discrasia sangüínea e distúrbios neurológicos.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Associações desaconselháveis

Dissulfiram: risco de surto delirante, estado confusional.

Álcool: efeito antabuse (calor, vermelhidão, vômito, taquicardia). Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e de medicamentos contendo álcool durante o tratamento com secnidazol.

Associações que necessitam precaução de uso

Anticoagulantes orais (descrita com a varfarina): aumento do efeito anticoagulante e do risco hemorrágico por diminuição do metabolismo hepático.

Recomendam-se controle freqüente da taxa de protrombina e adaptação posológica dos anticoagulantes orais durante o tratamento com secnidazol e até 8 dias após o seu término.

REAÇÕES ADVERSAS

Distúrbios digestivos: náuseas, gastralgia, alteração do paladar (gosto metálico), glossites e estomatites; erupções urticariformes; leucopenia moderada, reversível com a suspensão do tratamento; mais raramente: vertigens, fenômenos de

incoordenação e ataxia, parestesias, polineurites sensitivo-motoras.

POSOLOGIA

Indicações	Adultos
Tricomoníase	Dose única de 2 comprimidos de 1000 mg (2000 mg); a mesma dose é recomendada para o cônjuge.
Amebíase intestinal e giardíase	Dose única de 2 comprimidos de 1000 mg (2000 mg).

Obs: O medicamento deve ser administrado em uma das refeições, preferencialmente à noite.

Os comprimidos devem ser tomados em dose única, conforme prescrição médica. Na impossibilidade da ingestão em dose única, ingerir os comprimidos em intervalo de alguns minutos, mas nunca em intervalo maior que 30 minutos, a fim de não comprometer a eficácia do tratamento.

SUPERDOSAGEM

Em caso de superdosagem com o produto, recomenda-se lavagem gástrica o mais precocemente possível e instituir tratamento sintomático, de acordo com o necessário.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Nº do lote, data de fabricação, prazo de validade: vide cartucho.

Registro M.S.: 1.0047.0297

Farm. Resp.: Luciana A. Perez Bonilha
CRF-PR nº 16.006



Fabricado por:

Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda.
Rod. Celso Garcia Cid (PR-445), Km 87, Cambé-PR
CNPJ: 61.286.647/0001-16 - Indústria Brasileira



Uma decisão saudável

Laetus: 820

Código: 46009033

Dimensões: 160 x 160mm